



NitroMin Cría

RECOMENDACIONES

Tipo de ganado

Cría 60 días antes de parir hasta 120 días después del parto, utilizar en pasturas de baja calidad. Solo para rumiantes.

Zonas (Principales)

A Nivel Nacional Clima caliente (Trópico Bajo)

Consumo esperado
(g/Animal/Día) 120 -200

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Fósforo	5.0 %	Mín
Calcio	6.8 %	Mín
Azufre	6.8 %	Mín
Zinc	0.600 %	Mín
Cobre	0.250 %	Mín
Magnesio	0.840 %	Mín
Cloruro de sodio	18.8 %	Mín
Selenio	0.004 %	Mín
Cobalto	0.004 %	Mín
Yodo	0.02 %	Mín
Equivalente Proteico NNP	47.4 %	Máx
Humedad	5.0 %	Máx
Flúor	0.05 %	Máx

- ✓ Las vacas se preñan hasta en 20 días antes de lo normal. (un 12% menos).
- ✓ Mejora la degradación del forraje.
- ✓ Mejora la condición corporal.
- ✓ Mayor producción de crías.
- ✓ Siempre hacer adaptación hasta llegar al consumo máximo de 200 (g/Animal/Día).
- ✓ Reemplaza la sal mineral en la etapa sugerida.